



Les cliniques gériatriques de la mémoire

ADRESSE POSTALE
C.P. 5787, Ste-Julie, Québec, J3E 1X6.

Tél. / Téléc. : -

À
À

www.cgm-quebec.ca

Date de naissance	No de dossier
Nom (à la naissance)	Prénom
Prénom du père	Téléphone
Adresse	

ÉCHELLE DE DÉPRESSION DANS LA DÉMENCE*

SYSTÈME DE NOTATION :

X : Impossible à évaluer 1 : Modéré ou intermittent
0 : Absent 2 : Sévère

A. TROUBLES DE L'HUMEUR

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 1. Anxiété | X | 0 | 1 | 2 |
| Expression anxieuse | | | | |
| Ruminations, inquiétude | | | | |
| 2. Tristesse | X | 0 | 1 | 2 |
| Expression et voix triste | | | | |
| Au bord des larmes | | | | |
| 3. Manque de réaction aux événements plaisants | X | 0 | 1 | 2 |
| 4. Irritabilité | X | 0 | 1 | 2 |
| Facilement irrité | | | | |
| Facilement en colère | | | | |
| 5. Agitation | X | 0 | 1 | 2 |
| Impatience, mouvements de frottement des mains d'étirement des cheveux | | | | |
| 6. Ralentissement moteur | X | 0 | 1 | 2 |
| Mouvements ralentis | | | | |
| Discours ralentis | | | | |
| Lenteur des réactions | | | | |
| 7. Plaintes fonctionnelles | X | 0 | 1 | 2 |
| Multiplés | | | | |
| (coter 0 en présence de symptômes gastro-intestinaux exclusifs). | | | | |
| 8. Perte des intérêts | X | 0 | 1 | 2 |
| Moins impliqué dans les activités habituelles | | | | |
| (coter seulement si un changement brutal est intervenu depuis moins d'un mois) | | | | |

B. SYMPTÔMES PHYSIQUES

- | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 9. Diminution de l'appétit | X | 0 | 1 | 2 |
| S'alimente moins que d'habitude | | | | |

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10. Perte de poids | X | 0 | 1 | 2 |
| (coter 2 si perte supérieure à 2 kg en un mois) | | | | |

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 11. Manque d'énergie | X | 0 | 1 | 2 |
| Se fatigue facilement | | | | |
| Incapable de soutenir une activité | | | | |
| (coter seulement si un changement brutal est intervenu depuis moins d'un mois) | | | | |

C. MODIFICATION DES RYTHMES

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. Variations de l'humeur dans la journée | X | 0 | 1 | 2 |
| Symptômes plus intenses le matin | | | | |

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 13. Difficultés d'endormissements | X | 0 | 1 | 2 |
| Plus tardifs que d'habitude | | | | |

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 14. Nombreux réveils nocturnes | X | 0 | 1 | 2 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|

- | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 15. Réveil matinal précoce | X | 0 | 1 | 2 |
| Plus précoce que d'habitude | | | | |

D. TROUBLES IDÉATOIRES

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 16. Suicide | X | 0 | 1 | 2 |
| Sentiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue | | | | |
| Désir de suicide | | | | |
| Tentative de suicide | | | | |

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17. Auto-dépréciation | X | 0 | 1 | 2 |
| Auto-accusation, diminution de L'estime de soi, sentiment d'échec | | | | |

- | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| 18. Pessimisme | X | 0 | 1 | 2 |
| S'attend au pire | | | | |

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19. Délire congruent à l'humeur | X | 0 | 1 | 2 |
| Idées délirantes de ruine, d'incurabilité, de perte | | | | |

INTERPRÉTATION : ≥ 10 / 38 est en faveur d'un état dépressif

ÉCHELLE CORNELL DE DÉPRESSION DANS LA DÉMENCE

* Tiré et adapté par D. Taillefer de CAMUS et al. (1995). Dépression et démence : contribution à la validation française de deux échelles de dépression : « Cornell Scale for Depression in Dementia » et « Dementia Mood Assessment Scale ». *L'encéphale*, XXI, 201-8.